

Nuorten porojen painon ja ruhon koostumuksen vaihtelusta talvikautena

MIKKO VARO

Helsingin Yliopisto, kotieläinten jalostustieteen laitos

Variation in the weight and composition of carcass of young reindeer during winter

MIKKO VARO


University of Helsinki, Department of Animal Breeding

Abstract. The carcasses of altogether 32 reindeer aged six months and eighteen months collected from different slaughters, were cut up and analysed to find out the influence of the date of slaughter on the quality of carcass. There were generally significant decreases in the live and carcass weights and in the weights of different tissues especially in late winter. The proportions of the tissues changed significantly. The most distinct and significant changes were found in the composition of meat: as the water content increased, the fat, protein and ash contents decreased.

Johdanto

Poro on sopeutunut elämään olosuhteissa, joissa ravinnon saanti vaihtelee jyrkästi eri vuodenaikoina. Lyhyt kesä on yltäkylläisyyden aikaa, jolloin ravintoa riittää paitsi talven aikana heikentyneen kunnon kohentamiseen, myös kasvuun ja vararavinnon keräämiseen. DRURI ja MITUSCHEV (1963) mainitsivat, että täysikasvuisen ja hyväkuntoisen poron ihonalaisen rasvakerroksen paksuus voi syksyllä olla jopa 8—9 cm. Talven niukoissa oloissa rasvavarasto hupenee, mikä ilmenee myös painon voimakkaana pienenemisenä. Oheinen piirros havainnollistaa vuodenaikojen säätelemän painonkehityksen jaksollisuutta.

Käyristä nähdään, että erityisesti kevättalvi koettelee eläinten kuntoa. Myös meidän omat koetulokset (VARO 1972) osoittavat kasvun rajoittuvan kesäkauteen ja talven merkitsevän painonkehityksen pysähtymistä tai taantu-



Piirros 1. Porojen painon kehitys (DRURI ja MITUSCHEV 1963).
 Figure 1. The development of the weights of reindeers (DRURI and MITUSCHEV 1963.)

mista. Kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana olivat syys- ja kevätpainojen keskiarvot:

	Naaraat	Urokset
Kevät 1963, syntymäpaino	5.7 kg	6.0 kg
Syksy 1963	40.5 »	45.5 »
Kevät 1964	40.5 »	46.1 »
Syksy 1964	57.9 »	70.3 »
Kevät 1965	59.0 »	66.7 »
Syksy 1965	59.9 »	84.0 »
Kevät 1966	61.7 »	81.1 »

Näin voimakas ympäristön vaikutus eläinten kasvuun ja kuntoon vaikeuttaa eri tutkimusaineistoista mitattujen lihantuotanto-ominaisuuksien vertailua. Helpompaa on vertailla ruhon eri kudosten suhteita ja lihan ravintoainekoostumusta, joskin ulkonaisten olosuhteiden ja mittausajan eroista johtuva virhemuuntelu aiheuttaa häiriöitä näissäkin. Kasvun ja ravitsemustilan kehityksen rytmi vaihtelee ajallisesti eri alueilla ja leveysasteilla, joten täsmällisten ja täysin vertailukelpoisten tietojen saaminen on lähes mahdotonta. Paikallisten eläinkantojen geneettiset erot voivat niin ikään lisätä tulosten vaihtelua.

MUHATSHEV (1971) on esittänyt monipuolista tietoa eri-ikäisten tundra-porojen teurasarvosta. Tässä rajoitutaan lähinnä sellaisten tulosten tarkasteluun, joilla on välitöntä mielenkiintoa omien tutkimusten kannalta. Ruhon eri

kudososien osuudet puolen ja puolentoista vuoden ikäisillä eläimillä olivat Muhatschevin mukaan:

	Urokset		Naaraat	
	$\frac{1}{2}$	$1 \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$1 \frac{1}{2}$
Lihaa	72.31 %	75.19 %	71.48 %	73.70 %
Rasvaa	3.49 »	1.57 »	6.33 »	4.61 »
Luuta ja rustoa	15.75 »	14.89 »	14.39 »	14.33 »
Jänteitä	8.45 »	8.35 »	7.80 »	7.35 »

Koska rasva on yleisesti määrältään vaihtelevin ruhojen kudososa, on täydennyksenä syytä mainita, että sen osuus vastasyntyneillä uroksilla oli vain 0.94 ja naarailla 0.82 %. Sen sijaan 5.5-vuotiailla määrät olivat uroksilla 7.52 ja naarailla 8.06 %. Rasvan suhteellinen osuus näyttää siis lisääntyvän iän mukana, joskaan ei välttämättä suoraviivaisesti.

Täysikasvuisen poron lihan koostumus on Muhatschevin mukaan:

Vettä	68.93 %
Valkuaisaineita	18.40 »
Rasvaa	11.03 »
Uuteaineita	0.64 »
Tuhkaa	1.00 »

RAZANOVSKOMN (ref. DRURI ja MITUSCHEV 1963) on esittänyt vastaavat tiedot häristä ja 5 kuukauden ikäisistä vasoista. Niiden lihan koostumus on:

	Härät	Vasat
Vettä	63.7 %	70.8 %
Valkuaisaineita	18.6 »	21.3 »
Rasvaa	16.1 »	6.0 »
Hiihihydraatteja	0.6 »	0.7 »
Tuhkaa	1.0 »	1.2 »

Näitä koostumuslukuja vertailtaessa on helppo havaita, että erot pituisuudessa johtuvat lähes kokonaan rasvan määrän vaihtelusta. Rasvattomaksi muunnetussa lihassa olisivat vesimäärät näet 77.48, 75.92 ja 75.32 %, valkuaismäärät 20.68, 22.17 ja 20.66 % sekä tuhkamäärät 1.12, 1.19 ja 1.28 %.

Omissa tutkimuksissa on pyritty selvittämään, mikä vaikutus talvikauden muuttuvilla ravitsemusolosuhteilla on nuorten porojen ruhon ja lihan koostumukseen. Valitettavasti näytteiden saanti kevättalvella osoittautui mahdottomaksi. Tutkimus on keskitetty nuoriin ikäluokkiin, koska ne sekä vasanlihan tuotannon että jalostusvalinnan kannalta ovat kiinnostavimmat. Alustava tieto talvenaikaisista muutoksista ruhon ja lihan laadussa voi antaa nykyistä paremmat edellytykset nuorten eläinten kasvatuksen ja valinnan suunnittelulle.

Tutkimusaineiston hankinta

Talvella 1969—70 kerättiin tutkimusaineistoksi vv. 1968 ja 1969 syntyneiden porojen ruhoja. Niiden tuli edustaa ikäluokkansa ja sukupuolensa keskitasoa teurastusajankohtana. Teurastukset tapahtuivat 12/11, 13/12, 5/2 ja 12/3. Kuhunkin teurastusryhmään tuli kahdeksan ruhoa, eli yhteensä 32.

Ruhot säilytettiin keväeseen Poro ja Riista Oy:n pakastamossa Rovaniemellä. Toukokuun lopussa ruhojen vasen puolikas leikeltiin ja lihan analysointia varten otettiin kaksi näytettä, paistista ja kaulasta, jotka lähetettiin vakuumpusseihin pakattuina hiilihappojäässä Viikkiin säilytettäväksi edelleen pakastettuina Helsingin Yliopiston elintarvikekemian ja -teknologian laitoksen varastotiloissa. Ylivoimaisten esteiden vuoksi päästiin analysointi suorittamaan vasta kesällä 1971. Paliskuntain yhdistys vastasi tutkimusaineiston hankinnasta. Sen kerääminen erotuspaikoilta ja ruhojen leikkely tapahtui yhdistyksen konsulentin, agrologi Veijo Tervosen johdolla. Analysointityön suoritti Liha-teknologian laitoksella maisteri Eila Karanko Tuottajain Lihakeskuskunnan taloudellisen tuen turvin. Kaikille asianosaisille lausun vilpittömän kiitoksen.

Tulokset

Tutkimusaineistolle arvioitiin ennakolta minimikoko, joka mahdollisimman pienin uhrauksin riittäisi antamaan tyydyttävät vastaukset asetettuihin kysymyksiin. Valitettavasti varastoimisaikana katosi neljä ruhoa, jotka teurastustulosten tarkoituksenmukaista tilastollista käsittelyä varten oli korvattava lasketuilla keskiarvoluvuilla. Tämä vähensi mahdollisuutta saada aineistosta esille etsittyjä eroja ja heikensi niiden tilastollista merkitsevyyttä. Myös yksi epäonnistunut rasvanmääritys oli korvattava keskiarvolla. Analyysitulosten tilastollista merkitsevyyttä testattaessa on käytetty havaintojen todellisia lukumääriä. Aineiston puutteista huolimatta tulosten julkaisemista on uhrautun työn ja rahan vuoksi pidetty aiheellisena.

Aineisto käsiteltiin ristikkäisellä varianssianalyysillä, jolla todettiin teurastusajan, iän ja sukupuolen vaikutus ruhoihin. Taulukossa 1 on esitetty luokkien keskiarvot ja niiden alapuolelle on merkitty asteriskein erojen merkitsevyydet: * = $P < 0.05$, ** = $P < 0.01$ ja *** = $P < 0.001$.

Kolmannen eli helmikuun teurastuksen poikkeuksellista aineistoa lukuunottamatta havaitaan kaikissa keskiarvoissa melko johdonmukainen laskusuunta, jopa luissa ja jänteissä. Voimakkaaksi painojen pieneneminen näyttää muodostuvan kuitenkin vasta kevättalvella. Erikoista tuloksissa on se, että rasvan määrän väheneminen ei ole ollut tilastollisesti merkitsevä, vaikka se suhteellisesti on ollut kaikkein suurin. Selityksenä on epäilemättä se, että rasvan määrän yksilöllinen vaihtelu on ollut tavattoman suuri. Onko tähän ollut vaikuttamassa se kirjoittajan aikaisemmin (VARO 1972) viittaama mahdollisuus, että talvikautinen painon — ja samalla ravitsemustilan — muutos saattaa perustua perittyihin yksilöllisiin kykyihin tyydyttää ravinnontarve äärimmäisen ankarissa oloissa. Kysymyksen jatkuva tutkiminen olisi erityisesti jalostusvalinnan perusteiden oikean määrittelyn kannalta tarpeellinen.

Myös ikäluokkien välillä rasvan määrässä ero on suhteellisesti suurin, mutta se ei silti ole yhtä merkitsevä kuin eräissä muissa ominaisuuksissa. Sukupuolet eroavat merkitsevästi vain luiden määrässä, mutta suhteellisesti suurin ero havaitaan rasvoittumisessa.

Taulukosta 2 nähdään teurasprosentin ja ruhon koostumuksen vaihtelu. Kudosten suhteelliset määrät muuttuvat selvästi vähemmän kuin absoluuttiset, niin että teurastuksen ajankohta ei ole ainoassakaan tapauksessa aiheut-

Taulukko 1. Painojen keskiarvot luokittain.

Table 1. Average weights according to month of slaughter, age and sex.

Luokitus Classification	Elopaino kg Live weight	Teuraspaino kg Carcass weight	Ruhon koostumus Composition of carcass				
			Lihaa	Rasvaa	Luuta	Jänteitä	
			kg Meat	g Fat	kg Bone	g Ligament	
Teurastusaika: Month of slaughter:							
11. -69	47.8	22.4	15.0	290	5.2	289	
12. -69	44.7	21.3	14.0	235	4.6	221	
2. -70	46.6	22.2	15.7	482	5.1	236	
3. -70	40.9	18.7	12.2	103	4.1	149	
Erojen merkitsevyys	—	*	**	—	**	*	
Significance of differences							
Ikä syksyllä 1969: Age in fall 1969:							
1/2 v y.	36.8	17.6	11.8	128	4.1	225	
1 1/2 v y.	53.2	24.7	16.7	428	5.4	222	
Erojen merkitsevyys	***	***	***	*	***	—	
Significance of differences							
Sukupuoli: Sex:							
Uros — Male	46.5	21.8	14.7	187	5.1	209	
Naaras — Female	43.5	20.5	13.8	370	4.3	238	
Erojen merkitsevyys	—	—	—	—	***	—	
Significance of differences							
Koko aineisto	45.0	21.1	14.2	278	4.7	223	
Total material							

tanut niihin merkitseviä eroja. Tämä osoittaa, että painonmenetyksessä kohdistuu koko elimistöön varsin tasaisesti ja saattaa merkitä, että eläin kuluttaa vararavinnokseen paitsi rasvaa myös muita kudoksia. Kuitenkaan ei voitane sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että parhaiten kehittyneet nuoret eläimet ovat suhteellisen runsaasti joutuneet teuraiksi jo alkutalvesta. Ikäluokkien ja sukupuolten erot ovat yleensä pienet, joskin rasvaa on vanhemmilla selvästi enemmän. Naarailla näyttää rasvaa myös olevan enemmän kuin uroksilla, mutta ero ei ole merkitsevä.

Verrattaessa lukuja edellä esitettyihin Muhatschevin ilmoittamiin koostumuslukuihin, havaitaan suuri ero luiden ja jänteiden määrissä. Koska näiden kudosten yhteismäärät näyttävät verraten yhdenmukaisilta jopa vastaavia ikäluokkia ja sukupuolia vertailtaessa, täytyy erojen syynä olla ilmeisesti luuja jännekudosten täysin erilainen erottelu. RYDBERGIN (1971) koetuloksista

Taulukko 2. Ruhon suhteellinen koostumus luokittain.

Table 2. Relative composition of carcass according to month of slaughter, age and sex.

Luokitus Classification	Teuras-% Slaughter-%	Ruhon koostumus — Composition of carcass			
		Lihaa % Meat	Rasvaa % Fat	Luuta % Bone	Jäniteitä % Ligament
Teurastusaika: Month of slaughter;					
11. -69	47.0	72.3	1.4	24.8	1.5
12. -69	48.2	73.4	1.2	24.2	1.2
2. -70	47.7	73.3	1.8	23.8	1.1
3. -70	45.6	73.6	0.5	25.0	0.9
Erojen merkitsevyys	—	—	—	—	—
Significance of differences					
Ikä syksyllä 1969: Age in fall 1969:					
1/2 v y.	48.0	72.8	0.6	25.2	1.4
1 1/2 v y.	46.3	73.6	1.8	23.6	1.0
Erojen merkitsevyys	—	—	*	*	*
Significance of differences					
Sukupuoli: Sex:					
Uros — Male	46.8	72.6	0.8	25.6	1.0
Naaras — Female	47.4	73.7	1.6	23.4	1.3
Erojen merkitsevyys	—	—	—	**	*
Significance of differences					
Koko aineisto	47.1	73.2	1.2	24.5	1.1
Total material					

laskettavissa oleva keskimääräinen luuprosentti n. 22.8 on sen sijaan varsin lähellä meidän aineistomme tuloksia. Ääriarvot hänen aineistossaan olivat 20.2—28.8 %.

Jos lihaprosentit muunnetaan vastaamaan rasvatonta ruhoa, ovat puoli- ja puolitoistavuotiaiden lihaprosentit 73.2 ja 74.9. Muhatsvchevin edellä esitetyn aineiston vastaavat luvut olisivat samoin muunnettuina 75.6 ja 76.8. Ero on samansuuntainen, mutta oman aineiston arvot jäävät jälkeen parin prosentin verran. Tämä ero saattaa johtua meidän koeaineistomme ruhojen pitkäaikaisesta säilytyksestä, joskin myös erilaiset teurastusajat voivat olla erojen aiheuttajina. Urosten ja naaraiden muunnetut lihaprosentit omassa aineistossa olivat 73.2 ja 74.9. Vastaavat luvut venäläisessä aineistossa olivat 75.7 ja 76.8, joten ero on jälleen samansuuntainen.

Rasvan määrien selvä ero suomalaisessa ja venäläisessä aineistossa johtuneenä pääasiassa laidunten erilaisuudesta tai erilaisesta teurastusajasta. Myös rotuerot voivat olla erojen syynä.

Taulukko 3. Lihan koostumus luokittain.

Table 3. Composition of meat according to month of slaughter, age and sex.

Luokitus <i>Classification</i>	Vettä % <i>Water</i>	Rasvaa % <i>Fat</i>	Valkuaisaineita % <i>Protein</i>	Tuhkaa % <i>Ash</i>
Teurastusaika: <i>Month of slaughter:</i>				
11. -69	73.6	3.2	21.6	1.02
12. -69	74.8	2.7	21.1	1.01
2, -70	74.9	2.5	20.9	1.00
3, -70	75.9	1.9	20.8	1.00
Erojen merkitsevyys	***	*	*	**
<i>Significance of differences</i>				
Ikä syksyllä 1969: <i>Age in fall 1969:</i>				
1/2 v y.	75.0	2.5	20.9	1.01
1 1/2 v y.	74.6	2.6	21.4	1.00
Erojen merkitsevyys	—	—	*	**
<i>Significance of differences</i>				
Sukupuoli: <i>Sex:</i>				
Uros — Male	75.1	2.2	21.2	1.01
Naaras — Female	74.4	3.0	21.1	1.01
Erojen merkitsevyys	*	**	—	—
<i>Significance of differences</i>				
Koko aineisto	74.8	2.6	21.1	1.01
<i>Total material</i>				

Taulukossa 3 esitetyt lihan koostumustiedot osoittavat, että koostumuksen muutos talvikautena on lihassa merkitsevä. Valkuaisaineiden, rasvan ja tuhkan vähetessä vesipitoisuus suurenee. Eri ikäluokkien ja eri sukupuolten keskiarvot ovat erittäin yhdenmukaiset. Selvä ero havaitaan vain siinä, että naarailla on lihan rasvapitoisuus merkitsevästi suurempi kuin uroksilla. Muuntamalla pitoisuudet rasvatonta lihaa vastaaviksi on lihaprosentti 76.8, valkuaisprosentti 21.7 ja tuhkaprosentti 1.04. Nämä vastaavat hyvin venäläisten aineistojen vastaavia pitoisuuksia. Suurimpana erona on meidän aineistomme pieni tuhkapitoisuus.

On erikoista, että tuhkamäärien erot eri teurastuksissa ja eri ikäluokissa ovat merkitsevät, vaikka ne absoluuttisesti ovat erittäin pienet. Tilastollisesti se on selitettävissä erittäin pienellä luokkien sisäisellä muuntelulla. Toisaalta nimenomaan teurastusaikojen aiheuttamien erojen merkitsevyys voi johtua siitä, että eläimet elävät tuhka-aineisiin nähden todella nälkäräjällä, jolloin minkä tahansa kivennäisaineen saannin vaikeutuessa hyvin pienetkin muutokset tuntuvat tilastollisessa tarkastelussa.

Mainittakoon täydennyksenä, että lihan rasva-, valkuaisaine- ja tuhka-pitoisuus oli paistissa hyvin (**) tai erittäin (***) merkitsevästi pienempi kuin kaulassa. Koska lihanäytteet jouduttiin ottamaan pakastetuista ruhoista, oli toinen näyte käytännöllisistä syistä otettava kaulasta eikä lavasta, kuten alunperin oli suunniteltu.

Vesipitoisuuden osalta laskettiin myös yksilöiden välinen muuntelu luokkien (so. teurastusaika — ikä — sukupuoli) sisällä. Yksilölliset erot olivat merkitseviä. Teurastusaikojen väliset erot pysyivät merkitsevinä myös yksilölliseen muunteluun verrattuna. Tämä osoittaa kuiva-aineen yleistä vähene- mistä, jonka merkitystä korostaa vielä se, että samanaikaisesti tapahtunut eri kudosten ja koko elimistön kuihtuminen on vähentänyt myös ravintoaineiden absoluuttimääriä.

Tulosten tarkastelu

Esillä oleva tutkimus pyrkii alun alkaenkin vain alustavan tiedon saami- seen talvikauden vaikutuksesta poron ruhoon. Odotettua suurempien häiriöi- den vuoksi täsmällisten johtopäätösten teko on puutteellisesta aineistosta vai- keaa. Saadut tulokset viittaavat siihen, että talvikauden vaikutus tutkittuihin piirteisiin tuntuu voimakkaasti vasta myöhäistalvella. Näyttää ilmeiseltä, että nuoretkin porot selviytyvät ilman vaurioita syksystä ja syystalvesta, jolloin niiden valinta tuleviksi jalostuseläimiksi pyritään suorittamaan.

Laajempaa merkitystä on niillä tuloksilla, jotka osoittavat sekä elimistön eri kudosten että lihaskudoksen ravintoainepitoisuuksien vähenevän talven ku- luessa. Tätä tapahtumaa voidaan tarkastella toisaalta tuotantoon liittyvänä ruokintaongelmana, koska se oikeuttaa odottamaan, että lisärehulla olisi kenties mahdollista torjua tuotannon pysähtyminen tai taantuminen taikka jopa tur- vata jatkuva kasvu myös talvikautena. Toisaalta asiaa voidaan tarkastella, kuten Druri ja Mitushev, poron sopeutumiskyvyn osoittajana. Sopeutuminen säännöllisesti vuorottelevaan yli- ja aliruokintaan on tehnyt porosta pohjoisten seutujen korvaamattoman hyötyeläimen. Voimakas pyrkimys poron ravinnon- tarpeen jatkuvaan tyydyttämiseen muunlaisin kuin porotalouden perinteellisin keinoin, saattaa helposti aiheuttaa niiden etujen vähenemisen, joita poro riistaeläimenä tarjoaa: se etsii itse ruokansa tarvitsematta hoitoa tai suojara- kennuksia. Kaikkia toimenpiteitä porotalouden kehittämiseksi on sen vuoksi tarkasteltava monipuolisesti kokonaistaloudellisina kysymyksinä. Nyt saadut tulokset eivät näin ollen oikeuta pitkälle meneviin päätelmiin siitä, kuinka talven aiheuttama häiriö poron ravitsemuksessa olisi torjuttava. Epäilemättä ne kuitenkin korostavat jo nyt omaksuttua pyrkimystä ohjata porotalouden tuo- tanto lähinnä talvilaitumia säästävään vasanlihan tuotantoon. Tämä tavoite on sopusoinnussa myös poronjalostuksen päämäärien kanssa. Jalostusvalinta muodostuu sitä tehokkaammaksi, mitä johdonmukaisemmin vasanlihan tuo- tanto teurastuksineen karsii laitumia kuluttamasta kaikki muut kuin hyvin kehittyneet, terveet ja voimakkaat varsinaiset jalostuseläimet.

Myös muut porojen ravitsemustilaa kohentavat toimenpiteet ovat tarpeel- lisia ja puolustettavissa, kunhan ne ovat taloudellisesti toteutettavissa. Nyt saadut tulokset viittaavat myös siihen, että porojen talvirehun kivennäisva-

jauksen korvaaminen on eräs tärkeistä ravitsemusongelmista. Vaikka jäkälillä on poikkeuksellinen kyky koota valikoivasti suuria määriä kivennäisaineita köyhältä kasvualustalta (HALE 1970), on poron tärkeimpien rehujäkälien sisältämä tuhkamäärä samoin kuin eri kivennäisaineiden määrät erikseen varsin pieniä (POIJÄRVI 1945, DRURI ja MATUSCHEV 1963). Siitä johtuu, että paitsi typen, myös kalsiumin ja fosforin tase on jäkäläruokinnassa negatiivinen. Oman tutkimuksen osoittama lihan talvenaikainen valkuais- ja tuhkakato saa tästä selityksensä. DJATSENKON (1971) mukaan ureakivennäisliäruokintakokeet Neuvostoliitossa ovat osoittaneet tällaisen liäruokinnan taloudellisesti kannattavaksi ja eläintappioita vähentäväksi. Myös RYDBERG (1971) pitää puutetilöjen torjumista liäruokinnalla tärkeänä, vaikka korostaakin erityisesti, että täydellinen ruokinta liärehuilla ei ole kannattavaa.

Porotalouden monitahoisten ongelmien ratkaiseminen näyttää tältä taustalta tarkasteluna edellyttävän soveltavia tieteitä monipuolisesti edustavan työryhmän perustamista ohjaamaan porotalouden tuottavuuden parantamiseen pyrkivää tutkimusta.

KIRJALLISUUS

- DJATSCHEKON, N. O. 1971. Primenie karbamidnomineralnoj prodkormki v severnom olenovodstve. Lyhennelmä: Urea-kivennäisliäruokinnan käyttö poronhoidossa. Porosymposiumi Rovaniemellä 26–27. 5. 1971, 123–141. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki.
- DRURI, I. V. & MITUSCHEV, P. V. 1963. Olenovodstvo, 243 s. Moskova i Leningrad.
- HALE, M. E. Jr. 1970. The Biology of Lichens, 176 s. Edward Arnold Ltd. London.
- MUHATSHEV, A. D. 1971. Mjasnaja prduktivnost severnyh olenej. Lyhennelmä: Porojen lihantuotannosta. Porosymposiumi Rovaniemellä 26–27. 5. 1971, 197–206. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki.
- POIJÄRVI, I. 1945. Jäkäläruokinnalla olevien porojen jäkälänkulutus syksystä kevääseen. Valt. Maatal. koet. Tied. 205.
- RYDBERG, A. 1971. Tillskottsutfodring till renar. Porosymposiumi Rovaniemellä 26–27. 5. 1971, p. 175–188. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki.
- VARO, M. 1972. Investigations on the possibilities of reinder breeding II. J. Scient. Agric. Soc. Finl. 44: 234–248.