

ERRATUM

Puhe ja kieli 3/2010 ja 4/2010 numeroiden kahdessa artikkelissa annettiin toisistaan poikkeavaa tietoa kuulonsa menettäneiden ja synnynnäisesti vaikea-asteisesti kuulovikaisten lasten sisäkorvaistuteleikkausten aloitusajankohdasta ja sisäkorvaistutetta käyttävien lasten määristä Suomessa (Sume, 2010, s. 189; Välimaa & Lonka, 2010, s. 131). Ensimmäinen kuulonsa menettänyt lapsi sai Suomessa sisäkorvaistutteen vuonna 1995 ja syntymästään asti vaikea-asteisesti kuulovikainen lapsi vuonna 1997 (Kokkonen, Mäki-Torkko, Roine, & Ikonen, 2009; Välimaa & Lonka, 2010). Arviot sisäkorvaistutteita käyttävien lasten määrästä vaihtelevat hieman eri lähteissä, koska ne ovat riippuvaisia tehdyn kyselyn ajankohdasta ja vuosittain tehtävien sisäkorvaistuteleikkausten määrästä (esim. Jero & Kentala, 2007; Kokkonen ym., 2009). Tällä hetkellä tuorein painettu tieto löytyy Kokkosen ym. (2009) artikkelista. Tieto perustuu tutkijoiden keväällä 2008 toteuttamaan kyselyyn, jolloin istutekättäjiä oli Suomessa noin 500, joista noin puolet oli aikuisia (ks. myös Välimaa & Lonka, 2010).

Teemanumeron toimittajat ja Puhe ja kieli –lehden päätoimittaja pahoittelevat lehteen lipsahtanutta kvantitatiivisen tiedon epätarkkuutta.

Taina Välimaa ja Eila Lonka
Teemanumeron toimittajat

Pentti Haddington
Päätoimittaja

LÄHTEET:

- Jero, J. & Kentala, E. (2007). Lasten sisäkorvaistutteen. *Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim*, 123, 2014–2018.
- Kokkonen, J., Mäki-Torkko, E., Roine, R.P., & Ikonen, T.S. (2009). Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus monimuinpuolisen sisäkorvaistutteen avulla. *Suomen Lääkärilehti*, 17, 1567–1577.